


## Betegtájékoztató a méh és a petevezetők ultrahangvizsgálatáról

*Tisztelt Asszonyom!*

A gyermekáldás elmaradásáért az esetek 30-50%-ában a petevezetők átjárhatóságának zavara illetve a méh üregének rendellenességei tehetők felelőssé. A petevezeték és a méh üregének az átjárhatósága alapvető feltétele a megtermékenyítésnek, így a terhesség létrejöttének, mert csak ebben az esetben lehetséges a hímivarsejtek és a petesejt találkozása. A méhüreg esetleges rendellenessége illetve a petevezeték átjárhatóságának tisztázása valamint a szoba jövő kezelés lehetőségeinek megítélése céljából javasoljuk most Önnek a méh és a petevezetők az alábbiakban részletezésre kerülő ultrahangvizsgálatát (ultrahanggal végzett **hysterosalpingográfia-t = HyCoSy-t**). Tájékoztatjuk egyben arról is, hogy a HyCoSy végzésének egyes esetekben terápiás haszna is lehet, mivel a befecskendezett folyadék a petevezetékek falának kismértékű összetapadását megszüntetheti, mely így kedvezhet a későbbi teherbeesésnek. Erre a kedvező "mellékhatásra" a beavatkozást követő hat hónapon belül számíthatunk.

### **A hysterosalpingográfia elve**

A méh és a petevezetők ultrahangvizsgálata során folyadékot fecskendezünk a méh nyakcsatornáján át a méh üregébe vezetett vékony csövön (katéteren) keresztül, mely először a méh üregét majd a petevezetőket rajzolja ki, végül pedig a hasüregbe jut, ahonnan később felszívódik. A vizsgálat folyamán ultrahangvizsgálattal ellenőrizzük a befecskendezett folyadék eloszlását illetve a szabad hasüregbe jutását. A vizsgálathoz altatásra általában nincs szükség.



Folyadék befecskendezése a méh  
és a petevezető üregébe HyCoSy során

### **A vizsgálat esetleges szövődményei**

A HyCoSy végzéséhez szükséges katéter méhüregbe történő bevezetése kisebb vérzést okozhat, mely hamar elmúlik, és az esetek döntő részében csak pecsételő jellegű. A méhnyak vagy méh olyan fokú sérülése, mely további kezelést igényel, rendkívül ritkán fordul elő. Előfordulhat, hogy a körültekintő előkészítés (lásd később) ellenére a befecskendezett folyadékkal együtt baktériumok jutnak a hüvelyből illetve a méhnyakból a petevezetőkbe esetleg a hasüregbe, és ott gyulladást eredményeznek. Igen ritka esetben ez a gyulladás olyan súlyos fokú lehet, hogy a petevezeték működésének illetve átjárhatóságának zavarát okozza. A befecskendezett folyadékot a betegek általában jól tűrik.

A szövődmények kockázatának csökkentése érdekében kérjük, hogy a következőkben részletezésre kerülő, előzetes kivizsgálással kapcsolatos előírásokat pontosan tartsa be, és az alábbi kérdéseinkre válaszoljon:

Tud-e arról, hogy valamilyen allergiás megbetegedésben (pl. szénanáthában) illetve gyógyszerekkel (különösen jódval, tápanyagokkal, ragtapasszal, helyi érzéstelenítővel szembeni túlérzékenységekben szenved?

igen/nem ha igen, miben.....

Előfordul-e, hogy a melléből tejszerű váladék szivárog? igen nem

Korábbi, kontrasztanyag alkalmazásával végzett vizsgálata során jelentkezett-e már Önél bőrkiütés, vérkeringési zavar vagy viszketés?

igen/nem, ha igen, milyen formában?.....

### **Teendők a hystersalpingográfia végzése előtt**

A kezelőorvosával folytatott megbeszélésen Ön kiválasztja azt a menstruációs ciklusát, mely alatt a vizsgálatot el szeretné végeztetni. A hystero-contrast- salpingográfia az alábbiakban részletezett kivizsgálást követően ambuláner (járóbeteg ellátás keretében, kórházi tartózkodás nélkül) történik.

A vizsgálatot megelőzően, a ciklus második felében hüvelyváladék vizsgálata javasolt. Negatív eredmény esetén egyelőre további tennivaló nincs. Pozitív eredmény esetén, célzott gyógyszeres kezelés szükséges. A kezelés (általában 7-10 nap) befejezése után kontroll vizsgálat javasolt. Hystero-contrast-salpingográfia csak negatív hüvelyváladék eredmény birtokában végezhető, mivel csak így csökkenthető a felszálló fertőzés kockázata.

Hysterosalpingográfiát a következő ciklus első felében, a menstruációs vérzés abbamaradását követően, minél hamarabb végezzük. A menstruációs vérzés abbamaradását követően a hüvely aspecifikus (nem "célzott") tisztítása céljából a kezelőorvosa által az előző ciklus során már előre felírt gyógyszereket használja egészen a HyCoSy végzését megelőző estig (naponta 1 db Klion-D hüvelytabletta reggel és 1 db Betadine hüvelykúp este mélyen a hüvelybe helyezve). Ebben a ciklusban a menstruáció elejétől a HyCoSy utáni második napig a házasársi együttlét kerülendő!

A vizsgálat előtt vérvétel szükséges (gyulladásra utaló jeleket – vértest süllyedés, fehérvérsejt szám emelkedése – vizsgáljuk).

A vizsgálat kizárólag akkor végezhető, ha az elvégzett tapintási lelet, hüvelyváladék- és vérvizsgálat nem kóros. Csak ily módon előzhetjük meg a kismencedei gyulladás HyCoSy végzése utáni kialakulását, melynek kockázata és következményei semmiképpen nincsenek arányban a HyCoSy végzése során kapott információval.

### **Teendők a HyCoSy végzésének napján:**

A vizsgálatra a megbeszélte időpontban kísérővel jelentkeznek.

Célszerű a vizsgálat előtt fél órával 2 tablettát Apranaxot beszedni, az alkalmazott folyadék bejuttatásakor illetve azt követően fellépő enyhe méhösszehúzóadások okozta alhasi fájdalom csökkentése céljából.

### **Teendők a HyCoSy végzése után:**

A vizsgálat után vérnyomás és pulzus ellenőrzés történik. Amennyiben a vizsgálat után panaszmentes kísérettel otthonába távozik, ahol kímélet javasolt.

Otthonában fellépő erős alhasi fájdalom, láz, rosszullét esetén azonnal keresse kezelőorvosát. Ilyen esetben kórházi felvételére is sor kerülhet.

A HyCoSy végzését követően két napig még kerülendő a szexuális együttlét, a kádban fürdés, és kímélnie kell magát a fokozott megterheléstől, felfázástól.

Amennyiben az Ön számára valami még nem teljesen világos a vizsgálatot illetően, vagy ha a vizsgálatról vagy egyéb hasonló diagnosztikus információhoz vezető vizsgálati lehetőségekről, az esetleges szövődményekről és azok gyakoriságáról még többet szeretne tudni, nyugodtan kérdezze kezelőorvosát! Örömmel állunk rendelkezésre további tájékoztatásában.

Megjegyzés:.....

.....

A fenti felvilágosítást elolvastam, megértettem, további kérdésem nincs. Kérem a vizsgálat elvégzését.

Budapest, .....év.....hó.....nap

.....  
Páciens vagy törvényes képviselő aláírása